

# DOMINATOR EXTRA SL

Továbbfejlesztett hatásfokozó adalékanyaggal ellátott, magas koncentrációjú totális gyomirtó szer.

## JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

Magról kelő gyomnövények esetében az engedélykiratban meghatározott alacsonyabb dózisban kell alkalmazni. Magról kelő kétszikűek esetében azok 4-8 valódi leveles fenológiai állapotban, magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 3-5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni.

Évelő kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövények esetében azok intenzív növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni, hogy a hatóanyag a gyomnövény föld alatti szaporító képleteibe is lejusson.

Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvezőbb hatás érhető el ősszel, amikor a tápanyag áramlása a rizómák felé a legintenzívebb. Szulák-félék ellen a virágzás idején, mezei acat ellen annak tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális időpontja.

A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag 15-25°C között és magas páratartalom mellett a

leghatásosabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követően 6 órán belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson a gyomnövényben.

**A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektől megvédendő kultúrnövényre nem kerülhet a hatóanyag, mert azt károsíthatja.**

## GYAKORLATI FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK

**Tarlókezelésre** évelő gyomnövények ellen tarlókántás után azok 15-30 cm-es nagyságakor. A tarlóművelést sekélyen kell végezni, oly módon, hogy a tarackok feldarabolódjanak, és ezáltal az alvó rügyek is kihajtsanak.

**Mezőgazdaságilag nem művelt területek:** utak, útpadkák, vízmentes állapotú vízelvezető árkok, ipari létesítmények, üzemanyag-töltő állomások, repülőterek, vasúti pályatestek, totális gyomirtására, ahol azt helyi rendelet nem tiltja.

## Állományszárítás napraforgó, repce, kukorica, szója kultúrákban



**Napraforgóban** a kezelést a kaszatók 20-30%-os, kukoricában a szemek 30-40%-os nedvességtartalmánál kell elvégezni. Gyommentes kultúrában az alacsonyabb, évelő gyomnövényekkel erősen fertőzött kultúrában a maga-

sabb dózisban célszerű alkalmazni.

**Légi kijuttatás:** kizárólag napraforgóban és kukoricában, legalább 10 ha összszefüggő táblaméret esetén, a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával és el-

sodródást gátló szórófej alkalmazásával. Légi kijuttatásnál a 44/2005. (V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

**Permetlé mennyiség:** 50-60 l/ha

Hidas traktorral végzett kijuttatás: nagy hasmagasságú (>150 cm) földi géppel csak a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag hozzáadásával juttatható ki a készítmény.

**Hatóanyag:** 480 g/l glifozát = 608 g/l glifozát dimetilammónium só

**Forgalmazási kategória:** III. (szabadforgalmú)

### Területi szaktanácsadók:

**HORVÁTH ZSOLT** Tel.: (30) 444-9107 • **RAJCSÁNYI MÁTÉ** Tel.: (30) 429-7354

**PIRGI ZOLTÁN** Tel.: (30) 351-3363 • **HORVÁTH PÉTER** Tel.: (30) 967-7121

**CSÁVÁS LÁSZLÓ** Tel.: (30) 326-3131 • **MAROSI ROLAND** Tel.: (30) 868-1426

**DANKÓ RÓBERT** Tel.: (30) 228-7435 • **PAPP ZOLTÁN** Tel.: (30) 249-8074



**Dow AgroSciences**

[www.dowagro.hu](http://www.dowagro.hu)

dominator  
**EXTRA**



**33%-AL TÖBB  
HATÓANYAG**



- Továbbfejlesztett hatásfokozó adalékanyaggal ellátott, magas koncentrációjú totális gyomirtó szer
- **Könnyebb és gyorsabb** lesz a betakarítás, hatékonyabb a cséplés az egységesen száraz állományban



**Dow AgroSciences**

[www.dowagro.hu](http://www.dowagro.hu)